

**Αγαπητοί μας γονείς,**

**σε περίπτωση που παρατηρείτε συχνά κάποιο από τα πιο κάτω σημάδια, σας παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε άμεσα με τον Λογοθεραπευτή του σχολείου μας, ο οποίος παρακολουθεί το παιδί σας.**

### **Συμπτώματα και σημάδια δυσφαγίας**

- Δυσκολίες με το μάσημα του φαγητού
- Δυσκολίες με την προετοιμασία του βόλου του φαγητού
- Υπερβολική σιελόρροια
- Πνίξιμο
- Παλινδρόμηση
- Το φαγητό κολλάει σε οποιοδήποτε σημείο της διατροφικής οδού
- Παράπονα πόνου κατά την κατάποση
- **Χάσιμο βάρους**
- **Πνευμονία**
- Αποπροσανατολισμός
- Ανικανότητα ν' αναγνωρίζει το φαγητό
- Δυσκολίες με την τοποθέτηση του φαγητού στο στόμα
- Βήξιμο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κατάποση
- Τακτικό βήξιμο του φαγητού προς το τέλος ή αμέσως μετά το γεύμα του παιδιού
- Παφλασμός στη φωνή του παιδιού (gurgly voice)
- Αυξημένες εκκρίσεις στον φάρυγγα ή στο στήθος μετά το γεύμα
- Δυσκολίες στην αναπνοή
- Καθάρισμα λαιμού (throat clearing)
- Αφυδάτωση
- Τακτικά επεισόδια υψηλού πυρετού
- Σφύριγμα των πνευμόνων (δεξιά κάτω κοίλη).

### **Ομάδα Λογοθεραπευτών Ειδικού Σχολείου «Ευαγγελισμός»**

Groher M. E. (1997) *Dysphagia. Diagnosis and management*. 3<sup>rd</sup> edition, Newton, M.A.: Butterworth Heinemann.

Murray J. (1999). *Manual of dysphagia assessment in adults*, Canada: Singular Publishing Group, INC.



